


BULLETIN TECHNIQUE

JUILLET 2025



NOUS CULTIVONS LA CONFIANCE DEPUIS 1921

peris.fr



LES RAVAGEURS


EUDEMIS - 3EME GÉNÉRATION DÉTERMINANTE

Le contrôle des parcelles montre que ce ravageur est particulièrement présent depuis le début de la campagne, avec des gradients de pression. Le département de l'Hérault est pour l'instant le plus impacté. Les secteurs de bord de fleuve, les parcelles historiquement atteintes sont plus sujettes à ce ravageur. **Dans certains secteurs, les populations sont importantes, voire très importantes.**

Les dégâts de la seconde génération sont visibles. **Dans certaines parcelles c'est 100% des grappes qui présentent des perforations.** Les chaleurs de cette fin juin à début juillet ne suffisent pas à limiter les populations, le nombre de pontes avortées reste faible. Les œufs sont pondus en cœur de souche et même en cœur de grappes avant le stade de la fermeture de grappe, ce qui au contraire, rend plus délicates les observations. Par crainte de bruler, des applications ont été retardées voire annulées, ce qui a permis le développement des œufs. Les perforations sont actuellement visibles avec des larves de toutes tailles.



La confusion montre son intérêt et son efficacité, cependant il convient de rester vigilant car sur des bordures d'ilot, sur des parcelles isolées, la pression reste présente et impacte de façon négative cette méthode de protection. Le suivi reste indispensable pour la bonne réussite de la protection.



Réseau Per'Observ: courbe de vol eudémis secteur Biterrois

PERIS SAS

N° D'AGREMENT LR00035

DISTRIBUTION DE PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES

Nous cultivons la confiance depuis 1921




LES RAVAGEURS

Les courbes de vols suivis par notre réseau Per'Observ attestent de la présence de ce ravageur dans de nombreux secteurs depuis le début de l'année.

Les toutes premières captures de papillons de 3^{ème} génération sont relevées dans les secteurs précoces ainsi que les toutes premières pontes.

Il est important de changer les glus et les capsules et de suivre régulièrement les captures de cette 3^{ème} génération.



Le positionnement de la confusion par pulvérisation avec Explovo Vit doit être réalisé avant le début du vol ou au plus tard, aux premières captures de papillons.

Le positionnement des insecticides doit être réalisé pour le Proclaim, le Fycilia, le Rapax AS, à partir des premières pontes et jusqu'au stade tête noire.

Le positionnement des insecticides doit être réalisé pour le Karaté Xflow et Décis protech au stade 1^{ères} éclosions.

La 3^{ème} génération s'annonce précoce, intense et sans doute étalée.

Le potentiel de récolte est prometteur et la bonne mise en œuvre de la protection sera déterminante pour la qualité de la vendange .

Extrait de notre gamme insecticide

Spécialités	Matières actives	Dose homologation / ha		ZNT	DRE	DAR	Nombre d'application AMM	UAB
		Cicadelle	Tordeuse					
Proclaim	Emamectine	Non homologué	1,5 kg	20 m	6 h	7 j	3	
Fycilia	Spinosad	Non homologué	2 L	20 m	6 h	14 j	3 (2/ravageur)	OUI
Rapax	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Non homologué	1 L	5 m	6 h	1 j	3	OUI
Karate X flow	Lambda-cyhalothrine	0,125 L	0,175 L	50 m	48 h	7 j	2	
Décis protech	Deltaméthrine	0,5 L	0,83 L	20 m	6 h	14 j	3	

PERIS SAS

N° D'AGREMENT LR00035

DISTRIBUTION DE PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES

Nous cultivons la confiance depuis 1921




LES RAVAGEURS

CRYPTOBLABES GNIDIELLA

Les prises de papillons sont en augmentation. Cette pyrale est désormais présente dans l'ensemble du vignoble. L'intensification de sa présence dans les vignes va se faire au fur et à mesure de la maturité du raisin. **Attention, tous facteurs accentuant un mauvais état sanitaire, constituent des portes d'entrée pour une infestation de la cryptoblabes : perforation eudémis, oïdium, cochenilles, pourritures...**

Les 1ers dégâts sont visibles dans certaines parcelles.



Réseau Per'Observ:
courbe de vol
Cryptoblabes secteur
Basse Vallée de l'Hérault

LUTTE CONTRE LA FLAVESCENCE DORÉE


Le troisième traitement contre la cicadelle vectrice de la maladie était à réaliser jusqu'au 15 juillet. Il conviendra à cette période d'être particulièrement vigilant sur l'apparition des symptômes suivants (sur tout ou partie de la souche) :

- Décoloration du feuillage : rougissement pour les cépages rouges, jaunissement pour les cépages blancs. Feuilles devenant "cassantes" et s'enroulant plus ou moins en fonction des cépages.
- Aoûtement absent ou partiel des sarments, qui peut donner un port "retombant" à la souche atteinte et rendre difficile sa détection car elle est cachée par les souches saines qui l'entourent.
- Flétrissement partiel ou total des inflorescences ou des grappes (avant vendange). Ces souches ne pourront plus produire normalement.

SOUS SURVEILLANCE: LA CICADELLE AFRICAINE

La cicadelle africaine (*Jacobiasca lybica*) est un insecte piqueur-suceur appartenant à la famille des Cicadellidae. Originare d'Afrique, elle appartient à la même sous-famille que la cicadelle des grillures (*Empoasca vitis*). A l'œil nu, elle est indiscernable de la cicadelle des grillures. En 2023, la cicadelle africaine a été signalée en Corse, puis dans le Var en 2024. Aujourd'hui, elle est également observée dans les Pyrénées-Orientales, ce qui indique une possible expansion sur le territoire.

Les dégâts observés sont plus importants que ceux causés par la cicadelle des grillures, avec une infestation souvent plus étendue sur la parcelle.



1 : Décoloration feuille Syrah. 2 : Cicadelles face inférieure feuille Syrah. 3 : Dessèchement des feuilles Syrah.
4 : Décoloration feuille Mourvèdre. 5 : Décoloration feuille Cinsaut. 6 : Décoloration feuille Cinsaut.

Source : Guides vignobles Rhône Méditerranée

PERIS SAS

N° D'AGREMENT LR00035

DISTRIBUTION DE PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES

Nous cultivons la confiance depuis 1921



LES MALADIES

MILDIOU

Les interventions visent essentiellement à la protection du feuillage, sauf dans quelques zones très touchées par la maladie où le faciès rot brun évolue encore. Les derniers orages (jusqu'à 90 mm de pluie) vont engendrer des nouvelles sorties de tâches. Un feuillage sain et actif est indispensable pour la bonne maturité du raisin et la mise en réserve.

Extrait de notre gamme anti-mildiou

Spécialités	Matières actives	Dose homologation / ha	ZNT eau	DRE	DAR	Nombre d'application AMM	Classement CMR	UAB
Copren Hi BIO	Hydroxyde de cuivre	3,75 kg	20 m	24 h	21 j	5		oui
Yucca	Oxychlorure de Cuivre	8,4 L	5 m	6 h	21 j	-		oui
Kocide Flow	Hydroxyde de cuivre	2,5 L	20 m	24 h	21 j	4		oui
Hélioculivre	Hydroxyde de cuivre	3 L	5 m	24 h	21 j	5		oui
BB Manica	Sulfate de cuivre	7,5 kg	5 m	24 h	21 j	5		oui

Extrait de notre gamme biostimulant à base de cuivre (sans ZNT, sans IFT)

Teneur en cuivre	Spécialités	Matières actives	Dose d'usage	dose de cuivre	UAB
Forte teneur en cuivre	Vivaculivre H2	Cu, Zn, Mn, Ca	2 kg	18%	Oui
	Vivaculivre WG	Cu, Zn, Mn	2kg	18%	non
	Cuivrol +	ascophyllum nodosum, Mn, Zn, Cu	2 L	15%	Oui
Faible teneur en cuivre	Arvor	ascophyllum nodosum, Mn, Zn, Cu	3L	7,5%	Oui
	AgroMos	Extrait de paroi de levure et Cu	1 L	4%	Oui



OÏDIUM

Les stades majoritaires au vignoble sont fermeture de grappe pour les cépages tardifs et début véraison pour le reste du vignoble. Ce stade marque une moindre sensibilité de la grappe sauf pour certains cépages sensibles et les parcelles avec une présence régulière de la maladie.

Extrait de notre gamme anti-oïdium

Spécialités	Matières actives	Dose homologation / ha	ZNT eau	DRE	DAR	Nombre d'application AMM	Classement CMR	UAB
Velkado	Cyflufenamid	0,5 L	5 m	24 h	21 j	2		
Kesys	Proquinazid	0,25 L	20 m	48 h	28 j	2	H 351	
Ancolie	Métrafénone	0,2 L	5 m	6 h	28 j	2		
Yaris	Fluxapyroxad	0,15 L	5 m	48 h	35 j	2		
Citrothiol Rainfree	Soufre	12,1 L	5 m	48 h	3 j	8		oui
Flosul	Soufre	4L	5 m	6 h	5 j	8		oui
Sufrea quick	Soufre	12,5 kg	5 m	6 h	21 j	8		oui
Thiovit Jet	Soufre	12,5 kg	5 m	6 h		8		oui
Vitisan	Hydrogénocarbonate de potassium	6 kg	5 m	6 h	1 j	4		oui
Taegro	Bacillus amyloliquefaciens souche FZB24	0,185 kg	5 m	24 h	3 j	10		oui

PERIS SAS

N° D'AGREMENT LR00035

DISTRIBUTION DE PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES

Nous cultivons la confiance depuis 1921



LES MALADIES

BOTRYTIS

Le risque de développement des pourritures augmentent avec le niveau de dégâts d'eudémis. De plus, les fortes précipitations risquent d'engendrer un rapide grossissement des baies et des éclatements.

Extrait de notre gamme anti-Botrytis

Spécialités	Matières actives	Dose homologation / ha	ZNT eau	DRE	DAR	Nombre d'application AMM	Classement CMR	UAB
Cantus	Boscalide	1,2 kg	5 m	6 h	21 j	1		
Erune	Pyriméthanol	2,5 L	5 m	6 h	21 j	1		
Vitisan	hydrogénocarbonate de potassium	6 kg	5 m	6 h	1 j	4		oui
Taegro	Bacillus amyloliquefaciens souche FZB24	0,370 kg	5 m	24 h	3 j	10		oui

QUALITÉ DE PULVÉRISATION

La qualité de la pulvérisation est essentielle, car elle permet à la fois de limiter les pertes de produits phytosanitaires lors de l'application et d'optimiser l'efficacité des traitements.

Cette campagne marquée par une forte pression fongique nous a permis de mesurer toute l'importance d'une qualité de pulvérisation optimale.

Pour les traitements contre les vers de grappes dans les jours à venir, cette qualité de pulvérisation sera une clé de la réussite.



Pour accompagner au mieux nos clients, PERIS propose plusieurs services de contrôle de la qualité de pulvérisation :



Le Drop'in est un système permettant d'évaluer **la répartition de la pulvérisation au cœur du feuillage sur différentes hauteurs**. Pour ce faire le système utilise un support en polyéthylène noir en forme de feuille de vigne. Une fois ces feuilles placées dans la végétation, l'opérateur pulvérise un mélange d'eau et d'argile.

Les impacts réalisés lors du passage sont ensuite évalués sur une échelle de 0 à 3.

Ce qui permet à l'utilisateur de se rendre compte d'éventuels problèmes ou limite de son appareil et d'y apporter les corrections nécessaires.



PERIS SAS

N° D'AGREMENT LR00035

DISTRIBUTION DE PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES

Nous cultivons la confiance depuis 1921



Le Quali'drop est un système permettant de régler la pulvérisation verticale de façon homogène. Deux panneaux noirs permettent de simuler des rangées de vignes, l'applicateur passe alors avec de l'argile diluée dans les mêmes conditions que dans le vignoble (au préalable bien définir les différentes hauteurs de végétation, écartement inter-rangs ...).

Après application de la solution, une interprétation est réalisée face par face en attribuant une note de 0 à 2. Suite à la notation, un réglage vertical est à faire si croisement, trou de pulvérisation, pulvérisation trop haute ou basse ...



Outre ces méthodes de mesures, il est important de vérifier régulièrement que vos pastilles ne soient pas bouchées, que la pression affichée sur votre manomètre est juste, que la vitesse d'avancement affichée correspond à la réalité ...

Bien pulvériser, c'est aussi ajuster au mieux la quantité d'eau en fonction de la végétation pour s'assurer de la bonne répartition des produits, notamment en fonction des types de taille (taille dite mécanique ou pas).

Avant les traitements, notamment en fin de saison avec les insecticides, l'écimage des parcelles permet une meilleure pénétration de pulvérisation.

La pulvérisation est une opération technique et pointue, n'hésitez pas à contacter votre technicien PERIS pour un accompagnement personnalisé.



LE POINT SUR LA FERTILISATION

RETOUR ANALYSES DE PETIOLES

Les analyses de pétioles de ce dernier mois montrent des signes de faiblesses sur les oligo-éléments notamment.

Sur les parcelles qui n'ont pas eu de fertilisation au sol cette année, voire les deux dernières années, nous avons des problèmes d'alimentation sur les éléments majeurs à savoir l'azote, le phosphore, la potasse, la magnésie.

Le calcium, élément important dans le grossissement des baies, est souvent bas.

Sur les cépages tardifs, il est intéressant de faire des apports avant fermeture de grappe.

Les fortes chaleurs ralentissent l'alimentation de la plante.

Des soutiens avec des apports foliaires ou en ferti-irrigation, dosés en N/P/K sont encore pertinents.

MISE EN RÉSERVES

Chaque année, le départ végétatif de la plante se fait sur les réserves que la plante a réalisé l'année précédente, notamment post-récolte.

Dès le mois de juillet, la plante commence à faire sa réserve en glucides, avec un pic après les vendanges. il est très important de conserver un feuillage sain et fonctionnel le plus tard possible.

Un soutien azoté serait un plus pour aider la plante. Foliaires ou ferti-irrigation seront de bons supports pour alimenter en azote en fin de campagne.

Les éventuelles pluies post-récolte pourraient également permettre de minéraliser l'azote du sol et de favoriser les mises en réserves à la condition que le feuillage soit dans un bon état sanitaire.

Des apports en oligo-éléments sont également bienvenus.

Les chloroses ferriques de début de campagne se corrigent de façon plus efficiente avec des apports en fer à cette période.

Pour toute question, n'hésitez à vous rapprocher de votre technicien PERIS.



LE POINT SUR L'ACTUALITÉ



ENHERBEMENT

Dès à présent préparez vos projets d'enherbement et passez vos commandes!

Les plantations précoces dès les premières pluies de l'automne sont un gage de réussite de vos enherbements. La disponibilité de certaines graines notamment en Agriculture Biologique pourraient s'avérer complexe au fil des mois à venir, **pensez à anticiper.**

ARRACHAGE

La campagne d'arrachage définitif touche à sa fin (date limite d'arrachage le 21 juillet, date limite des demandes de paiement le 22 juillet).

Les Pyrénées Orientales perdent 13 % des surfaces plantées, l'Aude 8 %, le Gard 7% et l'Hérault 4%.

La région Languedoc Roussillon va réduire son potentiel de production d'environ 10 000ha.



CÉRÉALES


La campagne de moisson touche à sa fin et c'est désormais l'heure des bilans. Les pluies printanières ont permis d'apporter de l'eau à un moment crucial du cycle de l'orge et des blés.

Ainsi grâce à un choix de variétés adaptées, les rendements sont satisfaisants. Les qualités sont dans l'ensemble bonnes avec toutefois quelques disparités dans certaines parcelles.



VISITE D'ESSAI AGROSUD


La période estivale est le moment où les visites des essais sont réalisées pour voir les nouveaux produits ou tester de nouvelles stratégies. Nos équipes participent à l'élaboration et à la diffusion des essais Agrosud.






Chaleur & Canicule

Ce début d'été est marqué par une vague de chaleur précoce et persistante.
Bien que moins intense que 2019, notre réseau de stations Sencrop a enregistré des températures supérieures à 40°C dans plusieurs secteurs.



Réseau Sencrop - Température maximale entre le 20 juin et le 7 juillet 2025



Source : Midi Libre

La Société PERIS tient à exprimer toute sa solidarité et son profond soutien aux habitants du Languedoc-Roussillon durement touchés par les incendies de ces derniers jours. Nos pensées vont aux familles sinistrées, aux personnes évacuées et à toutes celles et ceux qui affrontent cette épreuve avec courage. Nous adressons également nos plus vives félicitations et notre reconnaissance aux pompiers, aux forces de l'ordre et à l'ensemble des équipes de secours mobilisées. Leur engagement exemplaire force l'admiration.

La Direction et toutes les équipes PERIS restent bien évidemment aux côtés des agriculteurs dans ce moment difficile.





TÉMOIGNAGE CALSUN



La parole est à vous !

J'utilise le CALSUN depuis l'année dernière, après en avoir entendu parler par mon conseiller Pérès.

Chez nous, on a souvent des gros coups de chaud à cause de la garrigue autour, ça fait vraiment un effet de serre l'été, surtout dans les parcelles de Piquepoul. Avant d'utiliser le CALSUN, j'ai eu de gros soucis sur mes vignes lors des fortes chaleurs : effeuillage, échaudage, problèmes de maturité et de rendements... Et franchement, avant, il n'y avait pas grand-chose à faire, aucune intervention possible.

C'est en échangeant avec mon conseiller qu'on a décidé de tester CALSUN sur deux hectares, depuis l'an dernier. On l'a appliqué début juillet, dès que l'on a constaté que les températures allaient grimper autour de 37 à 40°C, entre la fermeture de grappe et la véraison, à 10L par hectare. J'ai vu la différence : le feuillage était plus sain, les baies mieux préservées, et à la récolte, il y avait plus de jus sur les parcelles traitées que par rapport au témoin. Visuellement j'ai vu la différence, confirmé à la récolte par un meilleur rendement.

L'essai est concluant et le retour sur investissement intéressant, on va donc reconduire cette année. J'en suis satisfait, et si d'autres rencontrent les mêmes problèmes de coups de chaud, à leur tour de tester ce produit pour se faire leur propre idée sur l'efficacité du Calsun.



*Nicolas Macia, viticulteur à Castelnau de Guers,
adhérent à la cave coopérative les Costières de
Pomérols, témoigne de l'utilisation du CALSUN.*

Calsun®

La protection contre les ravageurs
et le stress thermique



PERIS SAS

N° D'AGREMENT LR00035

DISTRIBUTION DE PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES

Nous cultivons la confiance depuis 1921



COLLECTES DES EMBALLAGES

moi je recycle! **CALENDRIER 2025**

16-17 avril / 18-19 juin / 20-21 août / 5-16 octobre 2025

AUCUNE REPRISE EN DEHORS DE CES DATES DE COLLECTE

Big bags	Sacs	Sacs papier	Fûts en plastique ou en métal	Bidons en plastique	Sacs, boîtes, bouchons	PPNU
Produits phytosanitaires, engrais et produits vétérinaires	Produits phytosanitaires	Produits phytosanitaires	Produits phytosanitaires	Produits phytosanitaires	Produits phytosanitaires	Produits phytosanitaires
Vidés et plats	Vidés et plats	Vidés et plats	Vidés et plats	Vidés et plats	Vidés et plats	Vidés et plats
en fagot	en fagot ou en sac	en fagot	en fagot	en fagot	en fagot	en fagot
Reçu: 1 en papier ou en plastique et 1 en carton de collecte	Reçu: 1 en papier ou en plastique et 1 en carton de collecte	Reçu: 1 en papier ou en plastique et 1 en carton de collecte	Reçu: 1 en papier ou en plastique et 1 en carton de collecte	Reçu: 1 en papier ou en plastique et 1 en carton de collecte	Reçu: 1 en papier ou en plastique et 1 en carton de collecte	Reçu: 1 en papier ou en plastique et 1 en carton de collecte

Attention aux bouchons !

1. Enlever les bouchons et les opercules (grosse protection) de tous les bidons.
2. Ranger-les dans la poche transparente qui contient les emballages souillés (ou "dans" en carton et sacs en papier)

Demandez vos sacs de collecte

Chaque lot sera contrôlé. Les déchets trop souillés ou en mal "l'ange" seront refusés.

Uniquement sur le site de Bé'ziers

PERIS **ADIVALOR**



LES EPI

Gamme disponible dans tous nos magasins.

MENTIONS LÉGALES

EXPLOYO VIT: Fournisseur: Syngenta France S.A.S N° A.M.M.: 2210439 Matières actives: E7,Z9-dodécadiénylacétate Formulation: Suspension de capsules Phrases de risque: H412, EUH401, P273, P280, P501 Cible: Tordeuses Dose: 200.0 diffuseurs/ha Mode d'application: traitement Insecticides ZNT: 5.0m DRE: 6h DAR: 21j

PROCLAIM:Fournisseur: Syngenta France S.A.S N° A.M.M.: 2100231 Matières actives: Emamectine benzoate Formulation: Granulé soluble dans l'eau Toxicité: SGH09 Phrases de risque: EUH 401, H410, P102, P260, P270, P273, P280, P391, P501 Cible: Tordeuses Dose: 1.5 kg/ha Mode d'application: traitement Insecticides ZNT: 20.0m DRE: 6h DAR: 7j

FYCILIA:Fournisseur: Corteva Agriscience France S.A.S. AMM N° 2190054 contenant 24 g/ L Spinosad. -SC - suspension concentrée. H410 - ; EUH401- EUH208 - P391 -P501 -P101- P102. DAR 14 jours DRE 6 heures ZNT et DVP 20 m (dont 20 m DVP) Stades d'application BBCH 12 à 58 et 71 à 85 Nombre max d'applications 3 au total (2 par ravageur)

RAPAX AS Fournisseur: CBC BIOGARD SAS N° A.M.M.: 2200048 Matières actives: Bacillus thuringiensis ssp kurstakissouche EG 2348 Formulation: Suspension concentrée Toxicité: Phrases de risque: EUH208, EUH401, P102, P270, P280, P301 + P310 Cible: Tordeuses Dose: 1.0 l/ha Mode d'application: traitement Insecticides ZNT: 5.0m DRE: 6h DAR: 1j

KARATE XFLOW Fournisseur: Syngenta France S.A.S N° A.M.M.: 9800336 Matières actives: Lambda-cyhalothrine Formulation: Suspension de capsule Toxicité: SGH07, SGH09 Phrases de risque: EUH 401, H302 + H332, H317, H410, P102, 261, P270, P280, P302 + P352, P304 + P340, P312, P391, P501 Cible: Cicadelle flavescence dorée Dose: 0.125 l/ha ; Vers de grappe Dose: 0.175l/ha Mode d'application: traitement Insecticides ZNT: 50.0m DRE: 48h DAR: 28j

DECIS PROTECH: Fournisseur: Bayer CropScience France N° A.M.M.: 2010023 Matières actives: Deltaméthrine Formulation: Emulsion de type aqueux Toxicité: SGH02, SGH09 Phrases de risque: EUH 208, EUH 401, H226, H410, P240, P280, P501 Cible: Cicadelle flavescence dorée Dose: 0.5 l/ha Vers de grappe Dose: 0.83l/ha Mode d'application: traitement Insecticides ZNT: 20.0mDRE: 6h DAR: 30j

COPREN HI BIO: Fournisseur: Albaugh TKI d.o.o AMM n°2090135 Matières actives: Sous forme de : cuivre de l'hydroxyde de cuivre : 200 g/kg Formulation : Granulé dispersable Toxicité : SGH05, SGH09 Phrases de risques : EUH401, H410, H318 Cible : Mildiou Dose : 3.75 kg/ha Mode d'application: Traitement fongicide ZNT : 5.0 m DRE: 24h DAR: 21j nombre max d'application : 5

YUCCA: Fournisseur: ISAGRO SPA AMM n°2000210 Matières actives: Sous forme de : oxychlorure de cuivre : 377.5 g/L Formulation : Suspension concentrée Toxicité : Phrases de risques : H410 Cible : Mildiou Dose : 8.4 l/ha Mode d'application: Traitement fongicide ZNT :5.0 m DRE:6h DAR: 21j

KOCIDE FLOW: Fournisseur: Belchim Crop Protection France SA N°A.M.M.: 9800304 Matière active: Cuivre de l'hydroxyde de cuivre Formulation: Suspension concentrée Toxicité: H302, H318, H332, H400, H410 Cible: Mildiou Dose: 2.5 l/ha Mode d'application: traitement Fongicides ZNT: 20.0m DRE: 24h DAR: 21j

HELIOCUIVRE Fournisseur: Action Pin N° A.M.M.: 9900227 Matières actives: Cuivre de l'hydroxyde de cuivre Formulation: Suspension concentrée Toxicité: SGH05, SGH07, SGH09 Phrases de risque: EUH 401, H302, H315, H318, H410, P270, P273, P280, P301 + P312, P302 + P352, P305 + P351 + P338, P310, P501 Cible: Mildiou Dose: 3.0 l/ha Mode d'application: traitement Fongicides ZNT: 5.0m DRE: 24h DAR: 21j

BB MANICA NC : Homologation et marque déposée par Manica S.P.A. Distribué par Vivagro. Selon le règlement (CE). 1272/2008 Mention de danger : H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. H332 : Nocif par inhalation. H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques,entraîne des effets à long terme. Cible: Mildiou Dose:7,5kg/ ha. ADR 21 jours. DRE 24 heures. ZNT = 5m

VELKADO: Fournisseur: Certis Europe BV N° A.M.M.: 2130067 Matières actives: Cyflufénamid Formulation: Emulsion de type aqueux Toxicité: SGH07, SGH09 Phrases de risque: EUH 208, EUH 401, H315, H411,P262, P270, P280, P332 + P313, P362 + P364, P501 Cible: Oidium Dose: 0.5 l/ha Mode d'application: traitement Fongicides ZNT: 5.0m DRE: 24h DAR: 21j

KESYS: Fournisseur: DuPont Solutions (France) S.A.S. N° A.M.M.: 2090001 Matières actives: Proquinazid Formulation: Concentré émulsionnable Toxicité: SGH05, SGH08, SGH09 Phrases de risque: EUH 401, H315, H318, H351, H411, P201, P280, P302 + P352, P305 + P351 + P338, P308 + P313, P310, P362, P391, P501 Cible: Oidium Dose: 0.25 l/ha Mode d'application: traitement Fongicides ZNT: 20.0m DRE: 48h DAR: 28j

ANCOLIE: Fournisseur: Basf Agro SAS N° A.M.M.: 2060050 Matières actives: Métrafénone Formulation: Suspension concentrée Toxicité: SGH09 Phrases de risque: EUH 208, EUH 401, H411, P273, P391, P405, P501 Cible: Oidium Dose: 0.2 l/ha Mode d'application: traitement Fongicides ZNT: 5.0m DRE: 6h DAR: 28j

YARIS: Fournisseur: Basf Agro SAS N° A.M.M.: 2160963 Matières actives: Fluxapyroxad Formulation: Suspension concentrée Toxicité: SGH08, SGH09 Phrases de risque: EUH 208, EUH 401, H351, H400, H410, P201, P202, P280, P281, P308 + P313, P391, P405, P501 Cible: Oidium Dose: 0.15 l/ha Mode d'application: traitement Fongicides ZNT: 5.0m DRE: 48h DAR: 35j

CITROTHIOL RAINFREE: Fournisseur: UPL France N° A.M.M.: 7700216 Matières actives: 825 g/l Soufre Formulation: Suspension concentrée Toxicité: Phrases de risque: H317, H319, SPe8 Cible: Oidium Dose: 12.1 l/ha Mode d'application: traitement Fongicides ZNT: 5.0m DRE: 48h DAR: 3j Cible: Excoriose Dose: 12.1 l/ha Mode d'application: traitement Fongicides ZNT: 5.0m DRE: 48h DAR: 3j

FLOSUL: Fournisseur: Vivagro N° A.M.M.: 2160818 Matières actives: Soufre Formulation: Suspension concentrée Toxicité: Phrases de risque: EUH 208, EUH 401, P101, P102, P262, P270, P302 + P352, P305 + P351 + P338, P391, P501 Cible: Oidium Dose: 4.0 l/ha Mode d'application: traitement Fongicides ZNT: 5.0m DRE: 6h DAR: 5j

SUFREA QUICK: Fournisseur: AFEPA (AZUFREIRA Y FERTILIZANTES PALLARES AMM n°2190652 Matières actives: Sous forme de : soufre : 800 g/kg Formulation : Granulé dispersable Toxicité : Phrases de risques : Cible : Oidium Dose : 12.5 kg/ha Mode d'application: Traitement fongicide ZNT : 5.0 m DRE: 6h DAR: 21j nombre max d'application : 8

THIOVIT JET MICROBILLES: Fournisseur: Syngenta France S.A.S N° A.M.M.: 2000018 Matières actives: Soufre pour pulvérisation (micronisé) Formulation: Granulé dispersable Toxicité: Phrases de risque: EUH 401, P102, P270, P280 Cible: Oidium Dose: 12.5 kg/ha Mode d'application: traitement Fongicides ZNT: 5.0m DRE: 6h DAR: 3j

VITISAN: Fournisseur: Andermatt Biocontrol N° A.M.M.: 2117200 Matières actives: Bicarbonate de potassium Formulation: Poudre soluble dans l'eau Toxicité: Phrases de risque: Cible: Oidium Dose: 6.0 kg/ha Mode d'application: traitement Fongicides ZNT: 5.0m DRE: 6h DAR: 1j

TAEGRO: Fournisseur: Syngenta France S.A.S N° A.M.M.: 2180651 Matières actives: Bacillus amyloliquefaciens souche FZB24 Formulation: Poudre mouillable Toxicité: Phrases de risque: P102, P261, P273, P280, P391, P501 Cible: Pourriture grise Dose: 0.37 kg/ha Mode d'application: traitement Fongicides ZNT: 5.0m

CANTUS: Fournisseur : Basf Agro SAS Dose :1.2kg/ha N°AMM : 2050076 Classement tox. :SGH09 Matière(s) active(s) : Boscalid Phrases de risque :P391, P273, P405, H411, EUH 401 Formulation : Granulé dispersable Mode d'application : traitement des parties aériennes Cibles : Pourriture grise ZNT : 5m DAR :21j DRE :6h

ERUNE: Fournisseur: ASCENZA (Sapac Agro France SAS) N° A.M.M.: 2150277 Matières actives: Pyriméthanol Formulation: Suspension concentrée Toxicité: Phrases de risque: EUH 208, EUH 401, H412, P102, P273, P391, P501 Cible: Pourriture grise Dose: 2.5 l/ha Mode d'application: traitement Fongicides ZNT: 5.0m DRE: 6h DAR: 21j


PERIS SAS

N° D'AGREMENT LR00035

DISTRIBUTION DE PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES

Nous cultivons la confiance depuis 1921

NOUS CONTACTER



Rendez-vous sur notre **site internet**.



04 67 31 12 12



contact@peris.fr

Et sur nos **réseaux sociaux** :



PERIS SAS

N° D'AGREMENT LR00035

DISTRIBUTION DE PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES

Nous cultivons la confiance depuis 1921