

BULLETIN TECHNIQUE

AVRIL 2026




NOUS CULTIVONS LA CONFIANCE DEPUIS 1921

peris.fr

SOMMAIRE

Situation Vignoble	p.3 à 6
Ordre d'introduction	p.7
Epamprage	p.8
Nutrition	p.9 à 12
Point sur l'olivier	p.13 et 14
Point réglementaire	p.15
Les EPI	p.16
Mentions légales	p.17
Contact	p.18

Après un hiver marqué par des pluies records (640 mm à Béziers, 596 mm à Narbonne, 617 mm à Perpignan entre le 1 octobre 2025 et le 31 mars 2026), la météo a radicalement changé avec une longue période de vent du Nord. Ce vent a offert l'opportunité de rattraper de nombreux travaux mis en suspens (finir la taille des parcelles inondées, broyage des sarments...). Les parcelles inondées sont progressivement redevenues accessibles. A ce jour, quelques rares zones restent encore compliquées d'accès.



Pluviométrie station Sencrop Béziers du 01 octobre 2025 au 31 mars 2026



Vitesse du vent station Sencrop Béziers du 01 février au 08 avril 2026


Malgré ce vent peu favorable aux maladies (mildiou et Black rot), les conditions antérieures ont été exceptionnelles **et le risque de ces maladies reste encore fort.**

D'après la modélisation, les épisodes de pluie de la mi-mars ont engendré des contaminations primaires de mildiou et de Black Rot. A cette période, le stade fde la végétation était le facteur limitant cependant, quelques parcelles avaient une végétation suffisante pour être contaminées.

Au vignoble aucun symptôme de mildiou ou de black rot ne sont pour l'instant observés.



SITUATION VIGNOBLE



Modélisation Xarvio cas parcelles précoces

Attention

Les conditions de stagnation de l'eau dans les parcelles ne sont pas prises en compte par la modélisation. Au fur et à mesure de l'atteinte du stade éclatement des bourgeons les contaminations mildiou sont possibles.

Il est important de rester vigilant à l'évolution de la météo qui peut rapidement rendre défavorable la situation des maladies dans vos parcelles notamment dans les zones inondées.




Pluies du 12 et 13 avril

Comme annoncé une perturbation est passée sur notre zone, avec des pluies variant d'une dizaine à une vingtaine de mm. D'après la modélisation Xarvio, ces pluies et les heures d'humectation ont pu engendrées des contaminations primaires de mildiou et des repiquages dans les parcelles les plus précoces.



Pluviométrie Sencrop du 12 au 13 avril Hérault



Pluviométrie Sencrop du 12 au 13 avril Aude

PERIS SAS

N°D'AGREMENT LR00035

DISTRIBUTION DE PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES

Nous cultivons la confiance depuis 1921

p.4

Extrait de notre gamme anti mildiou pour le démarrage de la saison jusqu'au stade pré-floraison



Spécialités	Matières actives	Dose homologation / ha	ZNT eau	DRE	Classement CMR	UAB
Solutions IFT blocontrôle	Phosphonates + cuivre		5 m - 20 m	6 h - 24 h		
Mikal Flash	Fosétyl-Aluminium + Folpel	4 kg	5 m	48 h	H351	
Zetyl Combi	Fosétyl-Aluminium + Folpel	4 kg	5 m	48 h	H351	
Hidalgo Star	Fosétyl-Aluminium + Folpel	3,75 kg	5 m	48 h	H351	
Zorvec Zelavin Zeus	Oxathiapiprolin + Phosphonate de potassium	0,2 L + 3,33 L	5 m	48 h		
Pandero Gold	Mefenoxam + Folpel	2 kg	5 m	48 h	H351	
Profiler	Fluopicolide + Fosétyl Al	3 kg	5 m	48 h	H361d	
Pack enervin Active + Epatan	Ametoctradine + Phosphonate de potassium	1,5 L + 2 L	5 m	48 h		
Yucca	Oxychlorure de Cuivre	8,4 L	5 m	6 h		oui



Les premiers drapeaux d'oïdium sont visibles sur les cépages sensibles comme le carignan et le chardonnay. Les contaminations par repiquage sont effectives mais pas encore visibles.

Les conditions climatiques de fin mars et depuis le 07 avril sont particulièrement favorables à cette maladie.

Ne négligez pas votre protection contre cette maladie, les premières interventions sont très importantes.



Modélisation Xarvio: pression oïdium sur feuilles et inflorescences



SITUATION VIGNOBLE

Extrait de notre gamme anti oïdium pour le démarrage de la saison jusqu'au stade pré-floraison.

Spécialités	Matières actives	Dose homologation / ha	ZNT eau	DRE	Classement CMR	UAB
Pack Black Dart * = Pupitre + Dartagnan	Difénoconazole + Soufre	0,2 L + 12,1 L	5m	48 h	H351	
Cerimonia *	Difénoconazole	0,2 L	5 m	48 h	H351	
Hoggar	Spiroxamine	0,6 L	20 m	48 h	H 361d/ H373	
Physalis *	Tébuconazole + Trifloxystrobine	0,16 kg	5 m	48 h	H 361d	
Rocca *	Difénoconazole + Cyflufenamid	0,5 L	5 m	48 h		
Citrothiol Rainfree	Soufre	12,1 L	5 m	48 h		oui
Flosul	Soufre	4L	5 m	6 h		oui
Essen'ciel	Huile essentielle d'orange douce	1,6 L	5 m	24 h	-	oui
Vitisan	Hydrogénocarbonate de potassium	6 kg	5 m	6 h		oui

* homologation Black rot

Pour améliorer votre protection oïdium en association avec votre spécialité commerciale utilisez Vitisan ® ou Essen'ciel.

VITISAN®

Efficacité préventive et desséchante validée

- **Assainir** les parcelles à historique oïdium.
- **Intégration facile** en programme avec une **efficacité préventive et desséchante**.
- **Multipathogène** : homologué **anti-oïdium et anti-botrytis** avec des effets secondaires reconnus sur **black rot et mildiou**.

Essen'ciel Vigne

- ✓ Assèchement des insectes à corps mou et des maladies fongiques.
- ✓ Partenaire dans la gestion des résistances.
- ✓ Exemption de LMR.
- ✓ Excellente capacité d'étalement.
- ✓ Biodégradable

PERIS SAS

N°D'AGREMENT LR00035

DISTRIBUTION DE PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES

Nous cultivons la confiance depuis 1921

ORDRE D'INTRODUCTION

En ce début de saison, il est important de rappeler que la préparation de la bouillie est une phase importante. **Respectez l'ordre d'introduction des spécialités en fonction de leur formulation.**
Agiter et attendre la bonne dissolution entre chaque produit.

CAS GENERAL

FORMULATIONS SOLIDES	1	WSB - sachets hydrosolubles
	2	SG - granulé soluble dans l'eau
	3	SP - poudre soluble dans l'eau
	4	WG - granulé dispersable
	5	WP - poudre mouillable
FORMULATIONS LIQUIDES	6	SC - suspension concentrée
	7	CS - suspension de capsules
	8	SE - suspo-émulsion
	9	OD - suspension concentrée huileuse
	10	DC - concentré dispersable
	11	EW - émulsion de type aqueux
	12	EC - concentré émulsionnable
	13	ME - micro-émulsion
	14	SL - concentré soluble
	15	Adjuvant
	16	Correcteur de carences
	17	Fertilisant

CAS PARTICULIER PRÉSENCE DE FOSETYL-AL

Poudres (WP) ou microgranulés (WG) ou formulations liquides (EC/EW)	Formulations liquides, suspensions concentrées (SC)
1 D'abord l'antimousse.	1 D'abord l'antimousse.
2 Puis mettre en suspension le produit contenant du Fosetyl®-Al.	2 Puis les suspensions concentrées (SC) en les mélangeant bien à l'eau, bien attendre la bonne dilution des produits avant réintroduction.
3 Puis verser dans l'ordre suivant, les formulations WP ou WG. Maintenir l'agitation et attendre la bonne dilution du produit avant l'introduction du second.	3 Incorporer les préparations à base de Fosetyl®-Al.
4 Terminer par l'adjonction des formulations concentrées émulsionnables (EC) et émulsions aqueuses (EW).	4 Terminer par l'adjonction, dans l'ordre, d'abord des formulations solides WP ou WG puis des formulations liquides, concentrées émulsionnables (EC) et émulsions aqueuses (EW).

Pour améliorer la qualité de la bouillie et obtenir un mélange homogène et stable, en début de préparation utilisez :
ISOTAC (0,25 %) ou le GEREZI (Adjuvant UAB 0,15 %)



GEREZI
Boostez votre efficacité !



UN POTENTIEL PROMETTEUR

Nos équipes mettront tout leur savoir faire, leur présence, leur réactivité pour vous accompagner au cours de cette saison pour atteindre vos objectifs.
PERIS vous accompagne, n'hésitez pas à joindre votre interlocuteur habituel.



EPAMPRAGE

Avec les chaleurs de ce début de printemps, les pampres sont parfois bien développés.

L'épamprage est une solution prophylactique dans la protection contre le mildiou, en éliminant pampres et les oublis de taille potentiellement contaminés.

Ce passage peut également permettre une régulation des adventices présentes.



Retrouvez nos solutions en magasins

PACK GOZAI MAX

LA NOUVELLE SOLUTION ÉPAMPRAGE et DÉSHÉBAGE

**Gozai**
5 litres

**Beloukha**
2 x 5 litres

- A base d'un produit de biocontrôle
- Gestion des adventices et/ou des pampres
- IFT limité

UNE ACTION RAPIDE QUI LIMITE LES REPOUSSES DURABLES

**Shark®**
Epamprage vigne

+

ADJUVANT AMM N° 2120186, HERBICIDES
Huile adjuvante à base de 40 % d'huile de tournesol
et 40 % de dérivés d'alcool de sucre

DIFFUZ®

L'HUILE VÉGÉTALE NOUVELLE GÉNÉRATION !

PERIS SAS

N°D'AGREMENT LR00035

DISTRIBUTION DE PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES

Nous cultivons la confiance depuis 1921

p.8

NUTRISCOPE SENSEEN :


Afin d'affiner le diagnostic nutritionnel au vignoble, nous utilisons chez PERIS la **pince Nutriscope de SENSEEN**.

Cet outil permet d'évaluer rapidement l'état nutritionnel de la vigne directement à la parcelle.

La pince fonctionne grâce à un système de capteurs optiques qui analysent la réponse de la feuille à différentes longueurs d'onde lumineuses. Cette technologie permet d'obtenir des indicateurs physiologiques liés à la nutrition de la plante et de détecter certains déséquilibres nutritionnels **avant même l'apparition de symptômes visibles sur les feuilles**.



Contrairement aux analyses classiques (sarments, pétioles ...), qui nécessitent des prélèvements et un délai d'analyse en laboratoire, **cet outil permet de réaliser un diagnostic immédiat au vignoble et d'adapter rapidement les interventions** lorsque cela est nécessaire.



À partir d'un ensemble de mesures réalisées à l'aide de la pince Nutriscope, il apparaît qu'en ce début de campagne, un nombre significatif de situations présente des niveaux déficitaires en fer (Fe) et en manganèse (Mn).

Dans certains cas, ces déficiences se traduisent déjà par des symptômes visuels précoces au vignoble, parfois observés dès les premiers stades phénologiques (chloroses internervaires, hétérogénéité de croissance). Dans d'autres situations, les analyses révèlent une carence latente, non encore exprimée visuellement, mais susceptible de se manifester rapidement en fonction des conditions pédoclimatiques et de la dynamique de croissance.

*Résultat analyse Chardonnay
Murviel-lès-Béziers 02 avril 2026*

CHLOROSE FERRIQUE :



*Chlorose ferrique sur
Chardonnay*

Le fer joue un rôle central dans de nombreux processus physiologiques, notamment dans la synthèse de la **chlorophylle et donc de la photosynthèse**. Lorsque la vigne manque de fer, sa capacité à produire de l'énergie diminue, ce qui ralentit son développement.

Mais l'impact ne s'arrête pas là. Une carence en fer entraîne également un **blocage de l'assimilation de nombreux autres éléments nutritifs**, notamment l'azote (N), le phosphore (P), le potassium (K) ainsi que plusieurs oligo-éléments essentiels.

La plante se retrouve alors dans une situation de déséquilibre nutritionnel global, ce qui peut entraîner une baisse de vigueur, un ralentissement de la croissance et, à terme, une diminution du potentiel de production. On estime qu'une chlorose ferrique installée peut conduire à des **pertes de rendement pouvant atteindre 20 %**.

C'est pourquoi il est important d'intervenir précocement dès les premières situations de carence. Dans ces cas, l'apport d'anti-carenciels à base de fer, comme certaines solutions de nutrition permet d'apporter rapidement l'élément manquant et de relancer l'activité physiologique de la vigne.

Extrait de notre gamme anti carenciel fer pour le démarrage de la saison

Spécialité commerciale	Composition principale	Dose conseillée
Gebefol Fe Mn	Fer chélaté EDTA 35 g/L + manganèse 30 g/L + glycine bétaine 50 g/L	2 à 3 L/ha
Symfolia	Fer chélaté EDTA 35 g/L + manganèse 25 g/L + acides aminés STIMAA 10%	2 à 3 L/ha
Chélonia Fe 93	Fer chélaté EDTA 93 g/L	1 L/ha



NUTRITION : AZOTE FOLIAIRE

Dans un contexte de fortes pluies en hiver, ayant empêché l'accès aux parcelles et aujourd'hui à une inflation où le coût des engrais azotés explose, de nouvelles solutions biologiques émergent pour aider les agriculteurs à fixer l'azote autrement. Ces innovations ouvrent la voie à des **sources d'azote plus autonomes, plus durables et moins dépendantes du marché des engrais.**


PRESTON :

Le presto N est composé d'une bactérie capable de fixer l'azote atmosphérique et de le rendre directement disponible pour la plante. Presto N apporte l'équivalent d'une vingtaine d'unités d'azote sur vigne (moyenne de tous les essais Corteva).




Mode d'action


Methylobacterium symbioticum Sb23 est une bactérie endophyte capable de fixer l'azote atmosphérique (N_2) et de le transformer en azote assimilable par la culture (NH_4^+).



Résultats ESSAIS Pérès 2025 : (Sauvignon - Béziers)



Augmentation de la teneur en chlorophylle, indicateur direct d'une meilleure disponibilité en azote, par rapport à un témoin non traité.



Augmentation de la teneur en azote assimilable par rapport à un témoin non traité

PERIS SAS


N°D'AGREMENT LR00035

DISTRIBUTION DE PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES

Nous cultivons la confiance depuis 1921

FREE N


Free N100 est une bactérie appliquée au sol qui fixe l'azote atmosphérique, puis le rend disponible pour les racines de la plante. Le Free N s'applique directement au sol en même temps que les herbicides ou l'épamprage, pour une mise en place simple et efficace.



Résultats ESSAIS Pérès 2025 : (Merlot - Bessan)



Augmentation significative de la teneur en azote par rapport à un témoin non traité.



Augmentation significative du rendement par rapport à un témoin non traité

La pousse végétative a repris doucement. De nombreux symptômes d'œil de paon et de cercosporiose sont visibles dans les vergers. D'autres symptômes pourraient encore sortir, au vu des conditions météorologiques. Le risque reste globalement fort tous secteurs confondus. Les fortes défoliations liées à ces maladies auront un impact sur la pousse des rameaux et la récolte.

Œil de paon (ou tavelure de l'olivier) :

Les symptômes visibles actuellement sont souvent liés à des contaminations hivernales, le temps d'incubation pouvant prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Une forte hygrométrie et des températures douces favorisent la propagation de la maladie, qui peut altérer la production par la mauvaise qualité de photosynthèse de l'arbre, voire la chute des feuilles.



Symptômes d'œil de paon
Source : France Olive



Symptômes de cercosporiose
Source : France Olive

Cercosporiose :

La fructification des conidies se déroule à l'automne sur les feuilles de plus d'un an, en conditions humides et avec des températures comprises entre 10°C et 20°C. Les pluies hivernales dispersent ces conidies pour aller contaminer les jeunes feuilles de moins d'un an. Une forte humidité en sortie d'hiver et des températures inférieures à 25°C favorise leur germination. L'incubation qui en résulte peut durer jusqu'à 14 mois avant de reproduire de nouvelles conidies. Au niveau symptômes, les feuilles présentent un feutrage grisâtre sur la face inférieure et vont finir par devenir jaune sur la face supérieure.



Spécialités	Matières actives	Dose homologation	ZNT eau	DRE	Classement CMR	UAB
Yucca	Oxychlorure de Cuivre	0,7 L/ hl	5 m		-	oui
Eqal DG	Bouillie Bordelaise	1,25 kg/ hl	5 m		-	oui
Curatio *	Polysulfure de calcium	16 l/ ha	20 m	48 h	-	oui

* Dérogation


Chenilles de teignes

Quelques chenilles de teigne sont actives sur les secteurs du pourtour méditerranéen et le vol des adultes vient de démarrer.

Surveillez les populations avec des pièges afin d'évaluer le risque de la saison, qui semble actuellement faible à modéré.



Galerie de
Teigne



Cochenilles diaspines :

Ce type de cochenilles, dites à bouclier, ne produisent pas de miellat et ne provoquent donc pas de fumagine. Les dégâts potentiels ne sont cependant pas à négliger car elles ponctionnent la sève.

La récolte peut être fortement impactée, notamment sur les olives de bouche.



DEROGATIONS

Pulvérisation aérienne: l'Arrêté du 24 mars 2026 établit une dérogation à l'interdiction de pulvérisation aérienne pour autoriser temporairement l'application de produits phytopharmaceutiques par aéronef circulant sans personne à bord sur certaines parcelles de vignes et de vergers fruitiers dans les départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales.

A cas de besoin nous contacter, nous pouvons mettre en place cette solution.



Cuivres retirés par la décision de l'Anses du 15 juillet 2025: l'ordonnance rendue le 31 mars 2026 par le tribunal Administratif de Melun, a suspendu partiellement l'exécution de la décision de non-renouvellement de certaines spécialités commerciales. L'Anses dispose d'un délai de révision du dossier de 2 mois (31 mai 2026). Concrètement certaines spécialités commerciales redeviennent commercialisables selon les conditions d'emploi telles qu'elles étaient en vigueur avant la date du 15 juillet 2025, et ce jusqu'à la révision du dossier par l'Anses.

Exirel

Une dérogation d'utilisation de 120 jours est accordée entre le 01 avril et le 30 juillet 2026 concernant les cultures cerisier, uniquement autorisé pour lutter contre *Drosophila suzukii* et *Ragholetis cerasi*.

Admiral pro

Une dérogation d'utilisation est accordée entre le 04 mars et le 02 juillet 2026 concernant les cultures pommier, poirier, pêche, prunier, kiwi et oliviers.

Movento

Une dérogation d'utilisation de 120 jours est accordée entre le 01 mars et le 29 juin 2026 concernant les cultures cerisier, pêche, abricotier, prunier, pommier, poirier, cassissier, groseiller, myrtille.

Essen'ciel

Une dérogation d'utilisation est accordée entre le 01 avril et le 30 juillet 2026 concernant les cultures oliviers pour la lutte contre les cochenilles.

PENSER A COMMANDER VOS EQUIPEMENTS DE PROTECTION

A ce début de campagne de traitement phytosanitaires, pensez à renouveler vos Equipements de Protections individuels.

70 % des risques de contaminations sont liés avec le contact avec la peau: gants, combinaisons et tabliers sont des accessoires indispensables et faciles à mettre en œuvre. Contre les risques respiratoires et oculaires, utilisez les masques, demi-masque et lunettes.

La préparation de la bouillie reste une phase très sensible.

Pensez à changer les cartouches y compris dans la cabine du tracteur.

LA MSA reste votre interlocuteur et n'hésitez pas à signaler tout évènement à



MENTIONS LÉGALES

MIKAL FLASH: Fournisseur: Bayer CropScience France N° A.M.M.: 9500649 Matières actives: Fosétyl-Aluminium, Folpel Formulation: Granulé dispersable Toxicité: SGH02, SGH07, SGH08, SGH09 Phrases de risque: EUH 401, H252, H317, H319, H351, H400, P280, P308 + P313, P420, P501 Cible: Mildiou Dose: 4.0 kg/ha Mode d'application: traitement Fongicides ZNT: 5.0m DRE: 48h DAR: 28

ZETYL COMBI: AMM n°2120179 - Marque déposée par ASCENZA – Composition : 500 g/kg Fosétyl-Aluminium, 250 g/kg Folpel (WG). Marque déposée et détenteur d'homologation. P273, P280, P302+P352 E, P305+P351+P338, P308 + P313. EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. H317, H319, H351, H400. Cible mildiou 4kg/ha, ZNT 5 m,DRE 48 h, DAR 28 jours.

HIDALGO STAR: Fournisseur: Adama France N° A.M.M.: 9600512 Matières actives: Fosétyl-Aluminium, Folpel Formulation: Granulé dispersable Toxicité: SGH07, SGH08, SGH09 Phrases de risque: EUH 208, EUH 401, H319, H332, H351, H411, P102, P280, P302 + P352, P304 + P340, P305 + P351 + P338, P308 + P313, P501 Cible: Excoriose Dose: 0.3 kg/hl Mode d'application: traitement Fongicides ZNT: 5.0m DRE: 48h DAR: 3j Stade limite d'application BBCH10.

ZORVEC ZELAVIN: Fournisseur: DuPont Solutions (France) S.A.S. N° A.M.M.: 2180380 Matières actives: Oxathiapiprolone Formulation: Suspension concentrée huileuse Toxicité: SGH07, SGH09 Phrases de risque: EUH 401, H317, H411, P261, P280, P302 + P352, P333 + P313, P363, P391, P501 Cible: Mildiou Dose: 0.4 l/ha Mode d'application: traitement Fongicides ZNT: 5.0m DRE: 48h DAR: 14j

KAMPARANO: Fournisseur: DE SANGOSSE S.A.S AMM n° 2230464 Matières actives: Sous forme de : phosphonates de potassium : 755 g/L Formulation : Concentré soluble Toxicité : Phrases de risques : Cible : Mildiou Dose : 4 L/ha Mode d'application: Traitement fongicide ZNT : 5.0 m DRE: 6h DAR: 14j

PANDERO GOLD: Adama France N° A.M.M.: 2010398 Matières actives: Méfenoxam, Folpel Formulation: Granulé dispersable Toxicité: SGH07, SGH08, SGH09 Phrases de risque: EUH 401, H317, H319, H332, H351, H410, P102, P261, P270, P273, P280, P302 + P352, P304 + P340, P305 + P351 + P338, P308 +P313, P391, P501 Cible: Mildiou Dose: 2.0 kg/ha Mode d'application: traitement Fongicides ZNT: 5.0m DRE: 48h DAR: 28j

PROFILER: Fournisseur: Bayer SAS – Division Crop Science AMM n°2100181 Matières actives: 666.7 g/kg Fosétyl®-Al 44.4 g/kg fluopicolide Formulation : Granulé dispersable Toxicité : Phrases de risques : EUH 401, H401, H361d, H319 Cible : Mildiou Dose : 3 kg/ha Mode d'application: Traitement fongicide ZNT : 5.0 m DRE: 24h DAR: 28j

ENERVIN ACTIVE: Fournisseur: Basf Agro SAS N° A.M.M.: 2140270 Matières actives: Amétoctadine Formulation: Suspension concentrée Toxicité: SGH09 Phrases de risque: EUH 208, EUH 401, H411, P273, P391, P405, P501 Cible: Mildiou Dose: 1.5 l/ha Mode d'application: traitement Fongicides ZNT: 5.0m DRE: 6h DAR: 21j

EPATAN: Fournisseur: De Sangosse N° A.M.M.: 2100060 Matières actives: Phosphonate de potassium Formulation: Concentré soluble Toxicité: Phrases de risque: EUH 401, P102, P270, P273, P280, P501 Cible: Mildiou Dose: 4.0 l/ha Mode d'application: traitement Stimulateurs des défenses naturelles ZNT: 5.0m DRE: 6h DAR: 14j

YUCCA: Fournisseur: ISAGRO SPA AMM n°2000210 Matières actives: Sous forme de : oxychlorure de cuivre : 377.5 g/L Formulation : Suspension concentrée Toxicité : Phrases de risques : H410 Cible : Mildiou Dose : 8,4 L/ha Mode d'application: Traitement fongicide ZNT : 0.0 m DRE: 0 DAR: 0

PUPITRE: Fournisseur: SIPCAM N°A.M.M.: 2200905 Matières actives: 250g/l difénoconazole Formulation: concentré émulsionnable Toxicité : Phrases de risques : EUH 066, H401, H351, H373, H319, H304, Cibles : Oïdium 0,2l/ha Mode d'application: traitement Fongicide ZNT: 5.0m DRE: 48h DAR: 21j Black Rot Dose: 0,2 l/ha Mode d'application : traitement Fongicide ZNT: 5.0 m DRE : 24h DAR: 21j

DARTAGNAN: Fournisseur: SIPCAM N° A.M.M.: 8300063 Matières actives: 800g/l Soufre Formulation: Suspension concentrée Toxicité: Phrases de risque: EUH 208 Cible: Oïdium Dose: 12.5 l/ha Mode d'application: traitement Fongicides ZNT: 5.0m DRE: 6h DAR: 5j

CERIMONIA:Fournisseur Ascenza N° A.M.M. 2190047. Matières actives: 250 g/L Difénoconazole. Formulation: concentré émulsionnable Toxicité : Phrases de risques : EUH 066, H401, H351, H319, H304, H410. Cibles : Oïdium 0,2l/ha Mode d'application: traitement Fongicide ZNT: 5.0m Black Rot Dose: 0,2 l/ha Mode d'application : traitement Fongicide ZNT: 5.0 m DRE : 48h DAR: 21j

HOGGAR: Fournisseur: Bayer CropScience France N° A.M.M.: 9800420 Matières actives: Spiroxamine Formulation: Concentré émulsionnable Toxicité: SGH05, SGH07, SGH08, SGH09 Phrases de risque: EUH 401, H302 + H332, H315, H317, H318, H361d, H373, H410, P280, P305 + P351 + P338, P308 + P311, P310, P391, P501 Cible: Oïdium Dose: 0.6 l/ha Mode d'application: traitement Fongicides ZNT: 20.0m DRE: 48h DAR: 35j

PHYSALIS: Fournisseur: BAYER SAS (France) N° A.M.M.: 2090063 Matières actives: tébuconazole, trifloxystrobine Formulation: Granulé dispersable Toxicité: SGH07, SGH09, SGH08 Phrases de risque: EUH 401, EUH 208, H319, H361d, H362, H400, H410 Cible: Oïdium Dose: 0.16 kg/ha Mode d'application: traitement Fongicides ZNT: 5.0m DRE: 48h DAR: 21j Black Rot Dose: 0,12 kg/ha Mode d'application : traitement Fongicides ZNT: 5.0 m DRE : 48h DAR: 21j

ROCCA: Fournisseur: Syngenta France S.A.S N° A.M.M.: 2130049 Matières actives: Cyflufénamid, Difénoconazole Formulation: Concentré dispersable Toxicité: SGH09 Phrases de risque: EUH 401, H351, H410, P102, P270, P280, P391, P501 Cible: Oïdium Dose: 0.5 l/ha Mode d'application: traitement Fongicides ZNT: 5.0m DRE: 48h DAR: 21j

CITROTHIOL RAINFREE: Fournisseur: UPL France N° A.M.M.: 7700216 Matières actives: 825 g/l Soufre Formulation: Suspension concentrée Toxicité: Phrases de risque: H317, H319, SPe8 Cible: Oïdium Dose: 12.1 l/ha Mode d'application: traitement Fongicides ZNT: 5.0m DRE: 48h DAR: 3j Cible: Excoriose Dose: 12.1 l/ha Mode d'application: traitement Fongicides ZNT: 5.0m DRE: 48h DAR: 3j

FLOSUL: Fournisseur: Vivagro N° A.M.M.: 2160818 Matières actives: Soufre Formulation: Suspension concentrée Toxicité: Phrases de risque: EUH 208, EUH 401, P101, P102, P262, P270, P302 + P352, P305 + P351 + P338, P391, P501 Cible: Oïdium Dose: 4.0 l/ha Mode d'application: traitement Fongicides ZNT: 5.0m DRE: 6h DAR: 5j

ESSEN'CIEL: Fournisseur: Vivagro N° A.M.M.: 2090127 Matières actives: Huile essentielle d'orange douce Formulation: Concentré soluble Toxicité: SGH07, SGH09 Phrases de risque: H319, H332, H411, P102, P261,P280, P302 + P352, P333 + P313, P502 Cible: Oïdium Dose: 1.6 l/ha Mode d'application: traitement Insecticides ZNT: 5.0m DRE: 24h DAR: 1j. Cible Olivier*Trt Part.Aer.*Cochenilles Dose maximale d'emploi par application 8 L/h Du stade BBCH 09 au stade BBCH 75 DAR 1 jour

VITISAN: Fournisseur: Andermatt Biocontrol N° A.M.M.: 2117200 Matières actives: Bicarbonate de potassium Formulation: Poudre soluble dans l'eau Toxicité: Phrases de risque: Cible: Oïdium Dose: 6.0 kg/ha Mode d'application: traitement Fongicides ZNT: 5.0m DRE: 6h DAR: 1j

GOZAI:Fournisseur: Belchim Crop Protection France SA N° A.M.M.: 2110101 Matières actives: Pyraflufen-éthyl Formulation: Concentré émulsionnable Toxicité: SGH05, SGH07, SGH08, SGH09 Phrases de risque: EUH 066, EUH 401, H304, H315, H317, H318, H332, H410, P280, P301 + P310 + P331, P305 + P351 + P338 + P310, P312, P321, P333 + P313 Cible: Destruction des rejets Dose: 0.8 l/ha Mode d'application: traitement Herbicides ZNT: 5.0m DRE: 48h DAR: 90j

BELOUKHA: Fournisseur: Belchim Crop Protection France SA N° A.M.M.: 2140255 Matières actives: Acide pelargonique Formulation: Concentré émulsionnable Toxicité: SGH05 Phrases de risque: EUH 401, H315, H319, P264, P280, P332 + P313, P337 + P313, P362 + P364 Cible: Destruction des rejets Dose: 16.0 l/ha Mode d'application: traitement Herbicides ZNT: 5.0m DRE: 24h DAR: 1j

SHARK: Fournisseur: Cheminova Agro a/s N° A.M.M.: 2030011 Matières actives: Carfentrazone éthyl Formulation: Emulsion de type huileux Toxicité: SGH07, SGH09 Phrases de risque: EUH 401, H317, H410, P261, P280, P302 + P352, P333 + P313, P362 + P364, P501 Cible: Destruction des rejets Dose: 0.3 l/hl Mode d'application: traitement Herbicides ZNT: 5.0m DRE: 48h DAR: 90j

EQAL® DG: Fournisseur: UPL Homologation : N° 9800474. Composition : 20% de cuivre métal sous forme de bouillie bordelaise. Cible mildiou dose 3,75kg/ha. DAR 14 jours. DER 24 heures. ZNT 5m.

CURATIO: Fournisseur Andermatt AMM n°2140084, Composition : Polysulfure de Calcium, Concentration : 380g/L, Formulation : Concentré Dispersable (DC); DAR : 30 jours, DRE : 48h, ZNT : 20m, DSPPR : 10m, Olivier: Maladie du feuillage 16L/ha, 3 applications max sur cette période / 5 jours De BBCH 11 à BBCH 59.

EXIREL: Fournisseur FMC AMM 2150086, Matière active 100 g/ L de Cytraniliprole, Formulation SE. EUH401, SP1, SPe3, SPe8, H315, H317,H410, DSPPR 10m, DRE 48h, Cerisier*Trt Part.Aer.*Mouches des fruits Cerisier Uniquement autorisé pour lutter contre Drosophila suzukii et Ragholetis cerasi 1,125 L/ha par application 3 applications maximum (Intervalle minimum entre les applications : 10 jours) Du stade BBCH 71 au stade BBCH 87 DAR 3 jours

ADMIRAL PRO: Fournisseur PHILAGRO FRANCE AMM 20800060; Matière active 100 g/ L Pyriproxyfène. H304, H315, H319, H336, H400, H411. SP1, SPe3, SPe8, DSPPR 10 m, DRE 24h, DAR 14 jours

MOVENTO: Fournisseur BAYER SAS AMM 2110086, Matière active 100g/L Spirotétramate, H317, H361fd, H411, SP1, SPe3, SPe8, DSPPR 10 m,DRE 48 h, DAR 21 jours, 2 applications tous usages confondus

PERIS SAS


N°D'AGREMENT LR00035

DISTRIBUTION DE PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES

Nous cultivons la confiance depuis 1921

p.17

NOUS CONTACTER



Rendez-vous sur notre **site internet**.



04 67 31 12 12



contact@peris.fr

Et sur nos **réseaux sociaux** :



PERIS SAS

N°D'AGREMENT LR00035

DISTRIBUTION DE PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES

Nous cultivons la confiance depuis 1921

p.18