

BULLETIN TECHNIQUE

JUIN 2026



NOUS CULTIVONS LA CONFIANCE DEPUIS 1921

peris.fr

SOMMAIRE

Coups de chaud	p.3 et 4
Calsun®	p.5
Situation Vignoble Ravageurs	p.6 et 7
Situation Vignoble Maladies	p.8 et 9
Nutrition	p.10
Point Céréales	p.11
Point sur l'olivier	p.12 et 13
Point réglementaire	p.14
Collecte EVPP	p.14
Mentions légales	p.15
Contact	p.16



1ER COUP DE CHAUD AU MOIS DE MAI


ÉPISE DE CHALEUR DU 21 AU 30 MAI

des températures inédites en mai

Location	Température min.	Température max.	État du ciel
Saint-Brieuc (22)	20,5 °C	-	Partiellement nuageux
Dinard (35)	22,1 °C	-	Partiellement nuageux
Nantes (44)	21,9 °C	35,7 °C	Partiellement nuageux
Niort (79)	36,1 °C	-	Partiellement nuageux
Bordeaux (33)	36,6 °C	-	Partiellement nuageux
Bergerac (24)	36,0 °C	-	Partiellement nuageux
Carcassonne (11)	36,4 °C	-	Partiellement nuageux
Paris (75)	21,7 °C	-	Partiellement nuageux
Poitiers (86)	35,2 °C	-	Partiellement nuageux
Perpignan (66)	37,4 °C	-	Partiellement nuageux
Cap Béar (66)	26,2 °C	-	Partiellement nuageux

Carte éditée le 1^{er} juin 2026


METEO FRANCE



Dôme de chaleur sur la France © la chaine météo

Episode de chaleur du 21 au 30 mai
Source Météo France

Le 28 mai, dans notre réseau de stations météo Sencrop, les températures relevées dépassent souvent les 35 °C avec un pic à presque 40°C dans le Biterrois.




Températures réseau Sencrop28 mai 2026



COUPS DE CHAUD

Sur le vignoble, cette hausse brutale des températures est intervenue à une période charnière du développement de la vigne : floraison / nouaison. Ces chaleurs exceptionnellement élevées ont provoqué une forte augmentation de l'évapotranspiration et des besoins hydriques de la vigne.



Sencrop Bilan Hydrique / Evapotranspiration parcelle Montblanc mai et juin 2026

Toutefois avec les réserves acquises durant l'hiver et le printemps, la vigne a supporté ce stress. Dans les parcelles les plus exposées, la perturbation de la floraison a engendré de la coulure et/ou du millerandage.

Cet épisode a également contribué à accélérer le développement phénologique du vignoble, renforçant **l'avance végétative déjà observée depuis le début du printemps (≈10-15 jours)**.

Le week-end du 13 au 14 juin a également été particulièrement chaud.

D'après les prévisions météorologiques, une hausse progressive des températures est attendue **avec un nouvel afflux d'air chaud** à partir de dimanche pouvant entraîner une nouvelle augmentation des températures, avec des maximales susceptibles d'approcher, voire d'atteindre localement, les 40 °C.

Face à ces coups de chaud de plus en plus précoces et intenses, nous devons nous adapter et apporter **une solution souple d'utilisation, fiable, efficace et durable**.



Biostimulant certifié FPR

PERIS SAS

N°D'AGREMENT LR00035

DISTRIBUTION DE PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES



Nous cultivons la confiance depuis 1921



CALSUN®

CALSUN® est une protection contre le stress thermique et bien plus encore!

A base de carbonate de calcium, il protège les feuilles et les grappes de la chaleur, permettant d'abaisser la température à la surface des organes et de limiter les coups de soleil.



CALSUN® la nouvelle référence:



Formulation liquide, facile à utiliser



Large compatibilité avec les produits



Aucun phénomène d'abrasivité sur pompes et buses



Résiste au lessivage : jusqu'à 60mm



Lutte contre les stress thermiques



Assimilation du calcium



Lutte contre la prévention des ravageurs



Effet constaté sur Oïdium de la vigne



Utilisable en Agriculture Biologique



PERIS SAS

N°D'AGREMENT LR00035

DISTRIBUTION DE PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES

Nous cultivons la confiance depuis 1921




p.5



SITUATION VIGNOBLE

EUDEMIS

La 2ème génération est en cours avec dans de nombreuses parcelles des captures de papillons très conséquentes. Des pontes sont maintenant visibles.



PERIS SAS

N°D'AGREMENT LR00035

DISTRIBUTION DE PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES

Nous cultivons la confiance depuis 1921




SITUATION VIGNOBLE

D'après la modélisation Xarvio, nous sommes encore au début de la génération, le pic de vol n'est pas atteint dans la grande majorité des cas et **le dépôt des pontes va encore s'intensifier.**

Attention à ne pas reproduire les erreurs de 2025!

Même si une hausse des températures est annoncée, la chaleur seule ne suffit pas à détruire la génération. L'observation des pontes est parfois difficile car à l'abri à l'intérieur de la grappe avant sa fermeture.

Ne négligez pas cette 2ème génération!



— Oeufs — Larves — Chrysalide — Adultes

Modélisation Xarvio: 2ème génération

FLAVESCENCE DOREE

Dans le cadre de la lutte obligatoire contre le vecteur de la flavescence dorée, les traitements obligatoires T1 et T2 sont terminés. Le 3ème traitement est en cours en Agriculture Biologique (entre le 04 et le 16 juin). En Agriculture conventionnelle la date du 3ème traitement dépend de l'émergence des formes adultes. Les dates ne sont pas encore communiquées.

CICADELLES VERTES

Attention dans vos parcelles habituellement sensibles. Des larves sont visibles et localement les premiers dégâts sont visibles sur feuilles.

CRYPTOBLABES GNIDIELLA


Des papillons sont capturés dans les pièges, pour l'instant les prises restent faibles. La 1ère génération est toujours en cours.

Extrait de notre gamme insecticide

Spécialités	Matières actives	Dose homologation / ha		ZNT	DRE	Class ement CMR	UAB	Nombre d'applications AMM
		Cicadelle	Tordeuse					
Décis protech	Deltaméthrine	0,5 L	0,83 L	20 m	6 h			3
Karate X flow	Lambda-cyhalothrine	0,125 L	0,175 L	50 m	48 h			2
Fycilia	Spinosad	Non homologué	2 L	20 m	6 h		OUI	2 (3 applications par an et par cycle cultural pour contrôler l'ensemble des ravageurs)
Proclaim	Emamectine	Non homologué	1,5 kg	20 m	6 h			3
Rapax	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Non homologué	1 L	5 m	6 h		OUI	3 (3 applications maximum par an sur l'ensemble des ravageurs)

OÏDIUM

Depuis quelques jours au vignoble, on observe des sorties parfois importantes de symptômes d'oïdium. **Les conditions de développement jusqu'à la fin mai ont été très favorables à la maladie.** Tout écart dans la protection (retard de cadence, sous dosage, nombres de rangs traités, conditions de traitement défavorables) se caractérise par une présence d'oïdium dans les grappes.



Modélisation Xarvio: pression oïdium sur grappes de début avril à mi juin



Oïdium sur grappe de chardonnay

Extrait de notre gamme anti oïdium pour la fin de la saison

Spécialités	Matières actives	Dose homologation / ha	ZNT eau	DRE	Classement CMR	UAB	Nombre d'applications AMM
Rocca	Difénocanazole + Cyflufenamid	0,5 L	5 m	48 h	H 351		2
Velkado	Cyflufenamid	0,5 L	5 m	48 h	-		2
Kesys	proquinazid	0,2 ou 0,25 L	20 m	48 h	H351		2
Ancolie	Métrafénone	0,2 L	5 m	46 h	-		2
Nuganix	Fluxapyroxad	0,15 L	5 m	48 h	H 362		2
Hoggar	Spiroxamine	0,6 L	20 m	48 h	H 361d/ H373		3
Citrothiol Rainfree	Soufre	12,1 L	5 m	48 h	-	oui	8
Flosul	Soufre	4L	5 m	6 h	-	oui	8
Essen'ciel	Huile essentielle d'orange douce	1,6 L	5 m	24 h	-	oui	6
Vitisan	Hydrogénocarbonate de potassium	6 kg	5 m	6 h	-	oui	6

Le poudrage est un bon complément d'efficacité dans la lutte contre l'oïdium. **Toutefois attention aux potentiels effets de brûlure suivant les températures lors de votre application ou de chaleurs annoncées.** Pour minimiser les risques la solution, Solar poudrage réduit l'incidence du rayonnement solaire sur les feuilles et les fruits.



SITUATION VIGNOBLE

BOTRYTIS & RISQUE D'ÉCLATEMENT DES BAIES

Les conditions climatiques actuelles sont peu favorables au développement des pourritures. Toutefois, la taille des grappes et le potentiel de récolte font craindre à des éclatements de baies si les conditions météo changent ou si des pratiques d'arrosage sont mal maîtrisées.

Les apports de calcium permettent d'augmenter l'élasticité de la grappe.

Il est possible de combiner la protection anti oïdium et anti botrytis grâce à l'emploi du Vitisan.

VITISAN®

Efficacité préventive et desséchante validée

- **Assainir** les parcelles à historique oïdium.
- **Intégration facile** en programme avec une **efficacité préventive et desséchante**.
- **Multipathogène** : homologué **anti-oïdium et anti-botrytis** avec des effets secondaires reconnus sur **black rot et mildiou**.

MILDIU & BLACK ROT

Globalement la situation sur ces maladies est maîtrisée, le risque sur grappe devient moins important, attention toutefois aux parcelles avec symptômes. La protection du feuillage reste très importante pour assurer une bonne maturité du raisin et par la suite, la mise en réserve.

Spécialités	Matières actives	Dose homologation ou recommandée / ha	ZNT eau	DRE	Classement CMR	UAB	Nombre d'applications AMM
Solutions IFT biocontrôle	Phosphonates + cuivre		5 m	6 h	-		
Ampexio	Mandipropamid + zoxamide	0,5 kg	20 m	48 h	-		1
Yucca	Oxychlorure de Cuivre	1,5 L	5 m	6 h	-	oui	-



ACCOMPAGNER LA RECOLTE & MISE EN RESERVE

Le potentiel de production est très prometteur cette année, toutes les observations de terrain et les analyses confirment une bonne dynamique nutritionnelle.

Toutefois, nous constatons des carences précoces en potasse, accentuées par une forte libération d'azote et par les températures élevées du printemps.

À cela s'ajoutent quelques déficits en oligo-éléments qui méritent également une attention particulière.



Accompagner le végétal est indispensable pour éviter les blocages physiologiques et garantir une bonne maturité. Cela passe par une nutrition complète, régulière et adaptée, permettant non seulement de soutenir la vigne tout au long de son cycle, mais aussi d'assurer une mise en réserve optimale des éléments nutritifs pour l'année suivante.

Retrouvez notre gamme de biostimulation nutritionnels :




Pour aller plus loin, retrouvez les points clés de suivi et les observations du moment dans les épisodes de la Minute Phéno sur tous nos réseaux sociaux.





CEREALES

Les moissons ont démarré début juin par les pois protéagineux, les fèves et les orges. En fonction des dates de semis et des secteurs, nous observons des maturités très hétérogènes sur le blé dur et le blé tendre. **Cependant certaines parcelles présentent des signes d'échaudage dus aux fortes chaleurs de ces derniers jours, impactant les rendements.** Les premiers semis n'ayant pas subi le stress de l'excès d'eau de cet hiver présentent un potentiel de rendement correct, à l'inverse des semis tardifs qui voient leurs potentiels largement diminués.



STADES PHÉNOLOGIQUES :

La floraison est finie dans tous les secteurs et les olives commencent à grossir doucement.

MALADIE DU FEUILLAGE :


Les conditions météorologiques actuelles ne sont plus favorables aux contaminations, mais des dégâts des contaminations antérieures sont visibles. On observe d'ailleurs beaucoup plus de symptômes de Cercosporiose (feuilles jaunes) que d'œil de paon. Les défoliations sont principalement dues à la Cercosporiose.



Symptômes de cercosporiose
Source - France Olive

RAVAGEURS :


D'après les derniers BSV, les vols de la teigne ont baissé en intensité et très peu de dégât sont visibles.




Génération de la teigne de l'olivier
Source - France Olive

On observe quelques foyers pyrales du jasmin sur les bouts des rameaux. Le risque reste modéré.

Dégâts de pyrale sur jeunes pousses. Source - France Olive



Du fait de la taille des premières olives qui atteignent les 8 mm, la culture commence à devenir attractive pour **la mouche de l'olive**. Ces mouches peuvent piquer les jeunes fruits sous la peau et l'asticot va se développer dans l'olive en creusant une galerie, se nourrir de la pulpe et se nymphoser avant de sortir de l'olive sous forme d'adulte. Le cycle dure environ 1 mois et plusieurs générations peuvent se succéder de juin à octobre. Une femelle peut pondre plus de 200 œufs par jour mais un seul œuf par olive. Du fait de ces piqûres, une maladie fongique peut également se développer, la dalmaticose. Les mouches préfèrent bien évidemment les fruits les plus charnus. **Source BSV ARC – MÉDITERRANÉEN**



Mouche de l'olive mâle
Source: BSV Arc Méditerranéen



Mouche de l'olive femelle
Source: BSV Arc Méditerranéen



Piqûre de ponte
Source: France Olive

Pour se protéger des dégâts de la mouche, il faut installer des pièges alimentaires à base de phosphate diammonique ou des plaques engluées pour déterminer la présence et la nécessité d'intervention. Si la pression est modérée à forte, plusieurs solutions homologuées existent :

Spécialités	Matières actives	Dose homologation	ZNT	DRE	Classement CMR	UAB	Nombre d'applications AMM
Décis protech	Deltaméthrine	0,083l/hl	20 m	6 h			3
Karate X flow	Lambda-cyhalothrine	0,11 L	50 m	48 h			2
Syneis appât	Spinosad	1,2l/ ha	5 m	6h		oui	4
Baikal WP	Kaolin	60 kg/ ha *	5 m	6 h		oui	6

*1 application maximum au 1er passage à la dose de 50 kg/ha (60kg/ha pour les arbres hauts) - suivie, 10 à 15 jours après, de 5 applications maximum à la dose de 30 kg/ha en respectant un intervalle entre les applications de 20 à 30 jours



Je suis aussi utilisable en culture d'olivier.

MENTIONS LÉGALES

PROCLAIM: Fournisseur: Syngenta France S.A.S N° A.M.M.: 2100231 Matières actives: Emamectine benzoate Formulation: Granulé soluble dans l'eau Toxicité: SGH09 Phrases de risque: EUH 401, H410, P102, P260, P270, P273, P280, P391, P501 Cible: Tordeuses Dose: 1.5 kg/ha Mode d'application: traitement Insecticides ZNT: 20.0m DRE: 6h DAR: 7j

FYCILIA: Fournisseur: Corteva Agriscience France S.A.S. AMM N° 2190054 contenant 24 g/ L Spinosad. -SC - suspension concentrée. H410 - ; EUH401- EUH208 - P391 -P501 -P101- P102. DAR 14 jours DRE 6 heures ZNT et DVP 20 m (dont 20 m DVP) Stades d'application BBCH 12 à 58 et 71 à 85 Nombre max d'applications 3 au total (2 par ravageur)

RAPAX AS: Fournisseur: CBC BIOGARD SAS N° A.M.M.: 2200048 Matières actives: Bacillus thuringiensis ssp kurstakissouche EG 2348 Formulation: Suspension concentrée Toxicité: Phrases de risque: EUH208, EUH401, P102, P270, P280, P301 + P310 Cible: Tordeuses Dose: 1.0 l/ha Mode d'application: traitement Insecticides ZNT: 5.0m DRE: 6h DAR: 1j

KARATE XFLOW: Fournisseur: Syngenta France S.A.S N° A.M.M.: 9800336 Matières actives: Lambda-cyhalothrine Formulation: Suspension de capsule Toxicité: SGH07, SGH09 Phrases de risque: EUH 401, H302 + H332, H317, H410, P102, 261, P270, P280, P302 + P352, P304 + P340, P312, P391, P501 Cible: Cicadelle flavescence dorée Dose: 0.125 l/ha ; Vers de grappe Dose: 0.175l/ha Mode d'application: traitement Insecticides ZNT: 50.0m DRE: 48h DAR: 28j

DECIS PROTECH: Fournisseur: Bayer CropScience France N° A.M.M.: 2010023 Matières actives: Deltaméthrine Formulation: Emulsion de type aqueux Toxicité: SGH02, SGH09 Phrases de risque: EUH 208, EUH 401, H226, H410, P240, P280, P501 Cible: Cicadelle flavescence dorée Dose: 0.5 l/ha Vers de grappe Dose: 0.83l/ha Mode d'application: traitement Insecticides ZNT: 20.0mDRE: 6h DAR: 30j

AMPEXIO: Fournisseur: Syngenta France S.A.S N° A.M.M.: 2171119 Matières actives: Mandipropamide, Zoxamide Formulation: Granulé dispersable Toxicité: SGH07, SGH09 Phrases de risque: EUH 401, H317, H410, P102,P261, P280, P302 + P352, P333 + P313, P362 + P364, P391, P501 Cible: Mildiou Dose: 0.5 kg/ha Mode d'application: traitement Fongicides ZNT: 20.0m DRE: 48h DAR: 21j

YUCCA: Fournisseur: GOWAN france SAS AMM n°2000210 Matières actives: Sous forme de : oxychlorure de cuivre : 377.5 g/L Formulation : Suspension concentrée Toxicité : Phrases de risques : H410 Cible : Mildiou Dose : 8,4 L/ha Mode d'application: Traitement fongicide ZNT : 0.0 m DRE: 0 DAR: 0

ROCCA:Fournisseur: Syngenta France S.A.S N° A.M.M.: 2130049 Matières actives: Cyflufénamid, Difénoconazole Formulation: Concentré dispersable Toxicité: SGH09 Phrases de risque: EUH 401, H351, H410, P102, P270, P273, P280, P391, P501 Cible: Oïdium Dose: 0.5 l/ha Mode d'application: traitement Fongicides ZNT: 5.0m DRE: 48h DAR: 21j

VELKADO: Fournisseur: Certis Europe BV N° A.M.M.: 2130067 Matières actives: Cyflufénamid Formulation: Emulsion de type aqueux Toxicité: SGH07, SGH09 Phrases de risque: EUH 208, EUH 401, H315, H411,P262, P270, P280, P332 + P313, P362 + P364, P501 Cible: Oïdium Dose: 0.5 l/ha Mode d'application: traitement Fongicides ZNT: 5.0m DRE: 24h DAR: 21j

KEYSYS: Fournisseur: Corteva Agriscience France . N° A.M.M.: 2090001 Matières actives: Proquinazid Formulation: Concentré émulsionnable Toxicité: SGH05, SGH08, SGH09 Phrases de risque: EUH 401, H315, H318, H351, H411, P201, P280, P302 + P352, P305 + P351 + P338, P308 + P313, P310, P362, P391, P501 Cible: Oïdium Dose: 0.25 l/ha Mode d'application: traitement Fongicides ZNT: 20.0m DRE: 48h DAR: 28j

ANCOLIE: Fournisseur: Basf Agro SAS N° A.M.M.: 2060050 Matières actives: Métrafénone Formulation: Suspension concentrée Toxicité: SGH09 Phrases de risque: EUH 208, EUH 401, H411, P273, P391, P405, P501 Cible: Oïdium Dose: 0.2 l/ha Mode d'application: traitement Fongicides ZNT: 5.0m DRE: 6h DAR: 28j

NUGANIX: Fournisseur: Basf Agro SAS N° A.M.M.: 2160963 Matières actives: Fluxapyroxad Formulation: Suspension concentrée Toxicité: SGH08, SGH09 Phrases de risque: EUH 208, EUH 401, H351, H400,H410, P201, P202, P280, P281, P308 + P313, P391, P405, P501 Cible: Oïdium Dose: 0.15 l/ha Mode d'application: traitement Fongicides ZNT: 5.0m DRE: 48h DAR: 35j

HOGGAR: Fournisseur: Bayer CropScience France N° A.M.M.: 9800420 Matières actives: Spiroxamine Formulation: Concentré émulsionnable Toxicité: SGH05, SGH07, SGH08, SGH09 Phrases de risque: EUH 401, H302 + H332, H315, H317, H318, H361d, H373, H410, P280, P305 + P351 + P338, P308 + P311, P310, P391, P501 Cible: Oïdium Dose: 0.6 l/ha Mode d'application: traitement Fongicides ZNT: 20.0m DRE: 48h DAR: 35j

CITROTHIOL RAINFREE: Fournisseur: UPL France N° A.M.M.: 7700216 Matières actives: 825 g/l Soufre Formulation: Suspension concentrée Toxicité: Phrases de risque: H317, H319, SPe8 Cible: Oïdium Dose: 12.1 l/ha Mode d'application: traitement Fongicides ZNT: 5.0m DRE: 48h DAR: 3j Cible: Excoriose Dose: 12.1 l/ha Mode d'application: traitement Fongicides ZNT: 5.0m DRE: 48h DAR: 3j

FLOSUL: Fournisseur: Vivagro N° A.M.M.: 2160818 Matières actives: Soufre Formulation: Suspension concentrée Toxicité: Phrases de risque: EUH 208, EUH 401, P101, P102, P262, P270, P302 + P352, P305 + P351 + P338, P391, P501 Cible: Oïdium Dose: 4.0 l/ha Mode d'application: traitement Fongicides ZNT: 5.0m DRE: 6h DAR: 5j


ESSEN'CIEL: Fournisseur: Vivagro N° A.M.M.: 2090127 Matières actives: Huile essentielle d'orange douce Formulation: Concentré soluble Toxicité: SGH07, SGH09 Phrases de risque: H319, H332, H411, P102, P261,P280, P302 + P352, P333 + P313, P502 Cible: Oïdium Dose: 1.6 l/ha Mode d'application: traitement Insecticides ZNT: 5.0m DRE: 24h DAR: 1j

VITISAN: Fournisseur: Andermatt Biocontrol N° A.M.M.: 2117200 Matières actives: Bicarbonate de potassium Formulation: Poudre soluble dans l'eau Toxicité: Phrases de risque: Cible: Oïdium Dose: 6.0 kg/ha Mode d'application: traitement Fongicides ZNT: 5.0m DRE: 6h DAR: 1j

SYNEIS APPAT: Corteva Agriscience France n°AMM 2060130 Matières actives: Spinosad 0.24g/L. Concentré pour préparation d'appât. SP1, SPe3, SPe8, Olivier Mouche de l'olive 1.2L/ haZNT 5m, DRE 6 hDAR 7 j, 4 applications / an

BAÏKAL WP: Fournisseur Agri-Synergie N°AMM 2100038 Matières actives:Kaolin1000 g/ kg. SP1, SPe3, SPe8. Olivier: 1 application maximum au 1er passage à la dose de 50 kg/ha (60kg/ha pour les arbres hauts) - suivie, 10 à 15 jours après, de 5 applications maximum à la dose de 30 kg/ha en respectant un intervalle entre les applications de 20 à 30 jours

NOUS CONTACTER



Rendez-vous sur notre **site internet**.



04 67 31 12 12



contact@peris.fr

Et sur nos **réseaux sociaux** :



PERIS SAS

N°D'AGREMENT LR00035

DISTRIBUTION DE PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES

Nous cultivons la confiance depuis 1921

p.16